

FUNKSIYA TUSHUNCHASI



Yoqubjon Botirov Qosimovich

Toshkent davlat transport universiteti akademik litseyi
Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Funksiya so'zi lotincha "function" so'zidan olingan bo'lib, u sodir bo`lish bajarish degan ma`nolarni bildiradi. Funksiyaning dastlabki ta`riflari G.Leybnits, I.Bernulli, N.I.Lobachevskiy asarlarida berilgan.. Agar X to'plamning har bir elementiga Y to'plamning yagona elementiga biror qonuniyat bo'yicha akslanishi funksiya deyiladi.Y o'zgaruvchi Xning funksiyasi ekanligini $y=f(x)$ ko'rinishda belgilaymiz.Fransuz matematigi Rene Dekart(1596-1650)matematikaga o'zgaruvchi miqdor tushunchasini fanga birinchi bo'lib kiritdi. U o'zgaruvchi miqdor va funksiya tushunchalarini kiritdi.Funksiyaning berilish usullari analitik, jadval, grafik va so'z usullari bilan berilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Funksiya, akslantirish, analitik usul, jadval usuli, grafik usuli, Dirixli funksiyasi.Funksiya so'zi lotincha "function" so'zidan olingan bo'lib,u sodir bo`lish bajarish degan ma`nolarni bildiradi. Funksiyaning dastlabki ta`riflari G.Leybnits, I.Bernulli, N.I.Lobachevskiy asarlarida berilgan. Funksiyaning hozirgi ta`rifini bilish masada, qadimgi olimlar o'zgaruvchi miqdorlar orasida funksional bog`lanish bo`lishi lozimligini tushunishgan.To`rt ming yil avvalroq Bobil olimlari radiusi r bo`lgan doira yuzi uchun-xatoligi sezilarli bo`lsada formulasini chiqarishgan.

Sonning darajasi haqidagi ilk ma`lumotlar qadimgi bobilliklardan bizgacha yetib kelgan bitiklarda mavjud.Xususan,ularda natural sonlarning kvadratlari,kublari jadvallari berilgan.

Buyuk qomusiy daho Abu Rayhon Beruniy hamo`z asarlarida funksiya tushunchasidan,uning xossalardan foydalangan.Abu Rayhon Beruniy o`zining mashhur "QONUNI MA`SUDIY" asarining 6-maqolasida argument va funksiyaning o'zgarish oraliqlari,funksiyaning ishoralari va eng katta,eng kichik qiymatlarini ta`riflaydi. Ratsional ko`rsatkichli daraja S.Stevin,J.Vallis,I.Nyuton tomonidan kiritilgan.

Ixtiyoriy haqiqiy son uchun daraja tushunchasi L.Eyler ning "ANALIZGA KIRISH" asarida berilgan.Abu Rayxon Beruniy sinuslar va tangenslar jadvalini tuzadi. Huddi shu kabi boshqa mamlakatlarda ham asta -sekin funksiya tushunchasi rivojlna bordi. Turli davrlarda funksiyaga turlicha ta`riflar berila boshlandi. Quyida ayrimlarini keltiramiz. 1673 yilda Golfrit Vilgelm Leybnis (1649-1716) "funksiya" degan atamani kiritadi va biror vazifani bajaruvchi miqdor deb atadi. Dastlabki belgilashlar $f_1(x)$, $f_2(x)$, ..., $f_n(x)$ lar Leybnis tomonidan kiritildi.

Dastlabki oshkor ta'rifi esa yuqorida aytganimizdek 1718 –yilda Chagan Bernulli tomonidan berildi.

Biz funksiya tushunchasini kiritishdan oldin akslantirishlar haqida qisqacha tushunchaga ega bo'laylik. A va B to'plam bo'sh bo'lmasin.

Ta'rif. Agar A to'plamning har bir elementiga B to'plamning biror elementi mos qo'yilsa, A to'plam B to'plamga akslantirilgan deyiladi.Odatda akslantirishlar f, g, h kabi harflar bilan

belgilanadi.f : A B kabi yoziladi.Bizga X va Y bo'sh bo'lamagn to'plam berilgan bo'linsin.

Ta'rif. Agar X to'plamning har bir elementiga Y to'plamning yagona elementiga biror qonuniyat bo'yicha akslanishi funksiya deyiladi.Y o'zgaruvchi Xning funksiyasi ekanligini $y=f(x)$ ko'rinishda belgilaymiz.

x ni shu funksiyaning aniqlanish sohasi deb, ($D(f)$), Y to'plam $f(x)$ funksiyaning o'zgarish sohasi yoki qiymatlar sohasi deyiladi. E(f) ko'rinishda belgilanadi.

TA'RIF:O'zgaruvchi miqdorning funksiyasi deb o'zgarmaslar va o'zgaruvchilar yordamida biror usul bilan hosil qilingan qiymatga aytildi.

1834 –yilda Labachevskiy funksiya tushunchasini yanada oydinlashtiradi va hozirgi ta'rifga yaqinroq ta'rifni beradi.

TA'RIF:X ning funksiyasi deganda x ning har qanday qiymatiga mos kelgan va y bilan birga o'zgaradigan sonlarni bilamiz. Chex matematigi Bol'tsonoham mazmunan Labachevskiy ta'rifiga yaqin ta'rif beradi. 1834-yilda nemis matematigi Dirixle (1805-1850) funksiyani quyidagicha ta'riflaydi.

TA'RIF:y ni x o'zgaruvchining $[a, b]$ oraliqdagi funksiyasi deyiladi, agar x ning har bir qiymatiga y ning aniq bir qiymati mos kelsa.To'plamlar nazariyasi yaratilishi bilan uning ijodkorlari nemis matematigi G. Kontor, R. Yulitse, Dedikind funksiya tushunchasining umumlashmasi-akslantirishga ta'rif berdilar.

TA'RIF:X va Y to'plamlar berilgan bo'linsin. X to'plamni Y to'plamga akslantirish f berilgan deyiladi. Agarda X to'plamning har qanday x elementiga Y to'plamdagagi unga mos y element mos keltirilgan bo'lsa uni x elementning f akslantirishdagi obrazi deb ataladi.

Fransuz matematigi ReneDekart(1596-1650)matematikaga o'zgaruvchi miqdor tushunchasini fanga birinchi bo'lib kiritdi. U to'g'ri chiziqli koordinatalar usulini ishlab chiqdi,shuning dek o'zgaruvchi miqdor va funksiya tushunchalarini kiritdi.Bu bilan u geometriya va arifmetika orasidagi uzilishni bartaraf etdi. Shunday qilib,miqdorlar orasidagi bog'lanishlar sonlar orasidagi bog'lanishlar orqali foydalana boshladi, bu esa yaqqol ifodalananmagan sonli funksiya g'oyasidan iborat edi.Fanga o'zgaruvchi miqdorlarning kirib kelishi bilan hisoblash matematikasi va harfli algebra yanada rivojlandi.Koordinatalar yordamida miqdorlar orasidagi mosliklarni grafik ravishda tasvirlash mumkin bo'ldi.Rene Dekart“Geometriya”, “Uslug haqida

mulohazalar” asarlarini yozib, matematikada to‘g‘ri chiziqda nuqtaning koordinatalari usulini ishlab chiqdi, o‘zgaruvchi miqdor va funksiya tushunchalarini geometric talqin qildi. Miqdor orasidagi munosabatlarni yozishga, harflardan foydalanish natijasida algebraikshakl almashtirishlar yordamida bog‘lanishlarni boshqa ko‘rinishga o‘tkazish imkoniyati yaratildi. Dekart davriga kelib harfiy belgilashla takomillashdi, koeffitsiyentlar lotin harflari(a,b,c,...) bilan, noma’lumlar esa oxirgi lotin harfrlari(x,y,z,...) bilan belgilangan.

Funksiyaning berilish usullari.

Ikki o‘zgaruvchi miqdorni taqqoslashda bulardan birini erkli o‘zgaruvchi miqdor deb, ikkinchisini esa erksiz o‘zgaruvchi miqdor deb qarash qulaydir. Masalan doiraning radiusi R ni erkli o‘zgaruvchi miqdor deb, doiraning yuzi S ni esa erksiz o‘zgaruvchi miqdor deb hisoblash qulay.

Ikki o‘zgaruvchi miqdordan qaysi birini erksiz va qaysi birini erkli o‘zgaruvchi miqdor deb olinishi turlicha hal qilinadi. Masalan, temperatura o‘zgarmas bo‘lgan gaz bosimining o‘zgarishi nimaga olib kelishi bizni qiziqtirsa, bu holda bosimni erkli o‘zgaruvchi miqdor deb hajmini esa erksiz o‘zgaruvchi deb olish tabiiydir. Ushbu formula bilan quyidagicha ifodalanadi. Agar biz gaz qisilganda qanday xodisa bo‘lishini bilmoxchi bo‘lsak, yaxshisi hajmni erkli o‘zgaruvchi, bosimni esa erksiz o‘zgaruvchi miqdor deb qarash kerak. Bu holda u ushbu formula orqali ifodalanadi.

$$P=S/V$$

Keltirigan hollarning istalgan birida ikki miqdor o‘zaro shunday bog‘langanki, bulardan birining mumkin bo‘lgan har bir qiymatiga ikkinchisining to’la aniqlagan qiymati mos keladi.

Agar bir o‘zgaruvchi miqdor X ning har bir qiymatiga boshqa o‘zgaruvchi miqdor y ning to’la aniqlagan bitta qiymati biror fusul bilan mos keltirilgan bo‘lsa, bu holda f funksiya berilgan deyiladi. Bunda o‘zgaruvchi y miqdor erksiz o‘zgaruvchi miqdor yoki funksiya, x miqdor esa erkli o‘zgaruvchi miqdor yoki argument deyiladi. U o‘zgaruvchi x argumentning funksiyasi ekanini ifodalash uchun odatda quyidagilardan foydalaniladi: va xakazo.

Funksiyani berish degan so‘z argumentning qiymatlari bo‘yicha funksiyalarning mos qiymatlarini izlash demakdir. Biz maktab matematika kursida funksiyaning analitik usullarda berilishiga odatlanib qolganmiz. Bunday usulda erksiz o‘zgaruvchi miqdor (funksiya) ning erkli o‘zgaruvchi miqdor (argument) bilan bog‘lovchi formula ko‘rsatiladi, masalan: $y=x^2$; $y=lgx$; $s=\pi r^2$;

Funksiya—matematikaning eng muhim va umumiyligi tushunchalaridan biri. Funksiyaning turlari ko‘p bo‘lib, eng ko‘p qo‘llaniladigani bu chiziqli funksiyadir ya’ni. O‘zgaruvchi miqdorlar orasidagi bog‘lanishni ifodalaydi va muhim. Funksiya umumiyligi holda analitik, jadval, grafik va so‘z usullari bilan berilishi mumkin:

Analitik usul.Ko'pincha x va y o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish formulalar yordamida ifodalanadi.Bunda argument x ning har bir qiymatiga mos keladigan funksiyaning y qiymati x ustida analitik amallar —qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, darajaga ko'tarish, ildizdan chiqarish, logarifmlash va h.k.

$$y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}.$$

amallami bajarish natijasida topiladi. Odatda, bunday usul funksiyaning analitik usulda berilishi deyiladi. Funksiya analitik usulda quyidagi ko'rinishlarda berilishi mumkin.

1) $v=g(x)$ yoki $x=g(y)$ ko'rinishdagi formulalar bilan berilgan funksiyalar oshkor ko'rinishda berilgan funksiyalar deyiladi. Masalan, $y=6x-2$, $y=x^2+\ln x$ funksiyalar oshkor ko'rinishda berilgan. Analitik usulda berilgan funksiya bir nechta formulalar vositasida yozilishi ham mumkin, masalan,

Bu funksiyaning aniqlanish sohasi
bo'lib, u uchta formula yordamida berilgan.

2) Agar x va y o'zgaruvchilar qandaydir $F(x,y)=0$ tenglama bilan bog'langan, ya'ni tenglama y ga nisbatan yechilmagan bo'lsa, u holda funksiya oshkormas ko'rinishda berilgan deyiladi. Masalan, $x^2+y^2-R^2=0$ tenglama oshkormas shaklda berilgan funksiyani ifodelaydi, uni y ga nisbatan yechish natijasida ikkita funksiyani hosil qilamiz:

Ba'zi bir oshkormas ko'rinishdagi funksiyalarni $y = f(x)$ (oshkor) ko'rinishda

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \alpha \leq t \leq \beta,$$

ifodalashham mumkin. Har qanday oshkor ko'rinishdagi $y=f(x)$ funksiyani oshkormas ko'rinishda yozish ham mumkin: $y=f(x)=0$.

3) parametrik ko'rinishda, ya'ni

Shaklda berilishi. $y = f(x)$ funksiyada x ning y ga mos qo'yilishi parametr deb ataladigan uchunchi bir o'zgaruvchining yordamida ifodalanishi mumkin: bu yerda

(t) va $\psi(t)$ lar ham analitik usulda berilgan funksiyalar bo'lib, $D(\varphi) \cap D(\psi) \neq \emptyset$ deb hisoblanadi.


ГFunksiyalar berilishining eng ko'p uchraydigan usuli analitik usuldirdir. Bu usul matematik analizda juda ko'p ishlatiladi.

Jadval usuli.Ba'zi hollarda $x \in X$ va $y \in Y$ o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish formulalar yordamida berilmasdan, balki jadval orqali berilgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, t-yanvar oyining birinchi dekadasi (10 kunligi) kunlari nomeri bo'lsa, T —shu nomerli kuni soat 1600da Samarqand shahrida kuzatilgan havo haroratini bildirsin, natijada quyidagi jadvalga kelamiz:

bunda t —argument, T —funksiya bo‘ladi. Bog’lanishning bunday berilishi funksiyaning jadval usulda berilishi deb ataladi. Bu usuldan ko‘pincha miqdorlar orasida tajribalar o‘tkazish jarayonida foydalaniladi. Jadval usulining qulayligi shundan iboratki, argumentning u yoki bu aniq qiymatlarida, funksiyani hisoblamasdan, uning qiymatlarini aniqlash mumkin. Jadval usulining qulay bo‘lmagan tomoni shundan iboratki, argumentning o‘zgarishi bilan funksiyaning o‘zgarish xarakterini to‘liq aniqlab bo‘lmaydi.

Grafik usuli. x O y koordinata tekisligida x ning X to‘plam ($X = D(f)$) dan olingan har bir qiymati uchun $M(x,y)$ nuqta yasaladi, bunda nuqtaning abssissasi x , ordinatasi y esa funksiyaning x ga mos kelgan qiymatiga teng. Yasalgan nuqtalami tutashtirsak, natijada biror chiziq hosil boiadi, hosil bo‘lgan bu chiziqni berilgan funksiyaning grafigi deb qaraladi.

2-ta‘rif. Tekislikning $(x, J[x])$ kabi aniqlangan nuqtalaridan iborat ushbu to‘plam, funksiyaning grafigi deb ataladi. x O y tekisligida shunday L chiziq berilgan bo‘lsin, Ox o‘qda joylashgan nuqtalardan shu o‘qqa o‘tkazilgan perpendikular L chiziqni faqat bitta nuqtada kesib o‘tsin. Ox o‘qdagi bunday nuqtalardan iborat



f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f'	-3°	-5°	$+2^\circ$	$+5^\circ$	$+1^\circ$	0°	-2°	-5°	-3°	-1°


$$(x, f(x)) \} = \{(x, f(x)) : x \in X, y = f(x) \in Y\}$$

to‘plamni X orqali belgilaymiz. X to‘plamdan ixtiyoriy x ni olib, bu nuqtadan Ox o‘qiga perpendikular o‘tkazamiz. Bu perpendikularning L chiziq bilan kesishgan nuqtasini y bilan belgilaymiz. Natijada X to‘plamdan olingan har bir x ga yuqorida

ko'rsatilgan qoidaga ko'ra bitta y mos qo'yilib, funksiya hosil boiadi. Bunda x

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{agar } x \text{ ratsional son bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } x \text{ irratsional son bo'lsa.} \end{cases}$$

va y o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanish L cliiziq yordamida berilgan bo'ladi. Odatda funksiyaning bunday berilishi uning grafik usulda berilishi deb ataladi. Funksiyaning grafik usulda berilishi ilmiy tadqiqotlarda va hozirgi zamон ishlab chiqarishi jarayonlarida keng qo'llaniladi. Masalan, tibbiyotda uchraydigan elektrokardiogramma grafigi—yurak muskullaridagi tok impulslarining vaqt bo'yicha o'zgarishini ko'rsatadi. Bu grafik analitik tarzda yozilishi shart bo'lмаган biror $y = f(x)$ funksiyaning grafigidir, bu funksiyaning formulasi shifokor uchun unchalik qiziqarli emas. Funksiyaning grafik usulda berilishining kamchiligidan iboratki, argumentning sonli qiymatida berilgan funksiyaning aniq ko'rinishini har doim topib bo'lavermaydi, lekin bu usulning boshqa usullardan afzalligi uning ta'siri yaqqol ko'zga ko'rinishidadir.



So'zlar orqali ifodalanadigan usul. Bu usulda ($x \in X \pi \in Y$) o'zgaruvchilar orasidagi funksional bog'lanish faqat so'zlar orqali ifodalanadi. 1-misol. Har bir ratsional songa 1ni, har bir irratsional songa 0 ni mos qo'yish natijasida ham funksiya hosil bo'ladi. Bu funksiya, odatda, Dirixle funksiyasi deyiladi va $D(x)$ kabi belgilanadi: Funksiya umumiy holda

analitik, jadval, grafik va so'z usullari bilan berilishi mumkin ekan. Funksiyalar berilishining eng ko'p uchraydigan usuli analitik usuldir. Bu usul matematik analizda juda ko'p ishlatiladi. Jadval usulining qulayligi shundan iboratki, argumentning u yoki bu aniq qiymatlarida, funksiyani hisoblamasdan, uning qiymatlarini aniqlash mumkin. Biroq jadval usulining qulay bo'lмаган tomoni shundan iboratki, argumentning o'zgarishi bilan funksiyaning o'zgarish xarakterini to'liq aniqlab bo'lmaydi. Funksiyaning grafik usulda berilishi ilmiy tadqiqotlarda va hozirgi zamон ishlab chiqarishi jarayonlarida keng qo'llaniladi. Masalan, tibbiyotda uchraydigan elektrokardiogramma grafigi—yurak muskullaridagi tok impulslarining vaqt bo'yicha o'zgarishini ko'rsatadi.

Foydlanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.GAZIYEV, I. ISRAILOV, M .YAXSHIBOYEV FUNKSIYALAR VA GRAFIKLAR O'zbekiston Respublikasi Oliy va o 'rtta maxsus ta 'lim vazirligi tomonidan oliy ta 'lim muassasalari uchun o 'quv qo'llanma sifatida tavsiya etilgan "VORIS-NASHRIYOT" Т О С Н К Е Н Т –2006.
- 2.<http://edarslik.uz/algebra7/mavzu/rd.htm>
- 3.[https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Funksiya_\(matematika\)](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Funksiya_(matematika))