

УДК 591.1.(575.1)

**15-АЦЕТОКСИАЗОМЕТИН АТИЗИН ДИТЕРПЕНОИД
АЛКАЛОИДИННИНГ ЮРАК МУСКУЛИ ҚИСҚАРИШ ФАОЛЛИГИГА
ТАЪСИР МЕХАНИЗМИНИ ЎРГАНИШ**

Зайнабиддинов Анвар Эркинжонович¹,

Хайдаров Жавлонбек Бахтиёр ўғли²

Муталипов Азизбек Абдуллахон ўғли¹,

¹Андижон давлат университети

²Наманган давлат университети магистранти

E-mail: azaynobiddinov@bk.ru

Ключевые слова: 15-ацетоксиазометин атизина, папиллярной мышцы, частотах стимуляции, ионов Ca^{2+} , Ca^{2+} -каналов.

Key words: 15-acetox yazomethine atisine, papillary muscle, stimulation frequency, Ca^{2+} influx, Ca^{2+} -channels.

Кириш. Бугунги кунда ўсимликлардан ажратиб олинган дитерпен қатори алкалоидларнинг антиаритмик хусусиятларини ўрганиш борасида бир қатор илмий изланишлар олиб борилган [1]. Бироқ антиаритмик дори воситаларга талаб юқорилиги ва дитерпен алкалоидларнинг кардиотроп дори воситаларга таълаб юқорилиги ва дитерпен алкалоидларнинг кардиотроп таъсир самарадорлиги талабларга тўлиқ жавоб бермаслиги яни, антиаритмик хусусияти ортиши билан бирга уларнинг манфий инотроп таъсирини хам ортиб бориши ушбу йўналишдаги тадқиқотларни давом эттиришни тақозо қиласи. Шунинг учун манфий инотроп таъсири кам бўлган антиаритмик хусусияти юқори дитерпен алкалоидларни ўрганиш ва излаб топиш муҳим амалий аҳамиятга эга ҳисобланади [2].

ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институтида ўсимликларнинг Aconitum zeravshanicum туридан структурасига боғлиқ ҳолда таъсир кўрсатадиган бир қатор дитерпен алкалоидлар ажратилган. Уларнинг айримлари хусусан, 15-ацетоксиазометин атизиннинг антиаритмик фаоллиги ортиши кўрсатиб берилган [3].

Мазкур тадқиқотнинг мақсади 15-ацетоксиазометин атизин алкалоидининг каламуш юраги папилляр мускул қисқариш фаоллигига инотроп таъсир механизмини ўрганиш ҳисобланади.

Материал ва методлар. Тажрибалар оқ, зотсиз каламушлар (200-250 гр.) юраги ўнг қоринчасидан ажратиб олинган ва перфузияланган, ҳамда махсус тажриба идишига жойлаштирилган папилляр мускул препаратларида (диаметри



0,5-0,8 мм, узунлиги 1-3 мм) олиб борилди. Перфузиялаш учун қуидаги таркибдаги Кребс эритмасидан фойдаланилди (мМ): NaCl-118; KCl-4,7; CaCl₂-2,5; MgSO₄-1,2; KH₂PO₄-1,1; глюкоза-5,5; NaHCO₃-25, pH-7,4. Эритмалар 35°C ҳароратда карбоген (O₂ - 95%, CO₂ - 5%) билан оксигенланган. Папилляр мускул препарати тажриба камерасига махкамланди ва иккинчи учи билан F30 изометрик датчиги (Hugo Sachs, Германия) илгагига боғланди. Мускул препарати ЭСЛ-2 стимулятори ва Pt-электродлар ёрдамида 0,1-5 Гц частотада, 10 мс давомийликдаги, поғона даражасидан 20% ортувчи, түғри бурчак остида йўналтирилган импульс билан қўзгатилди. Мускуллар қисқаришини изометрик режимда кучайтиргич (ТАМ-А) ва TZ 4620 самописеци (Чехия) ёрдамида қайд килинди.

Олинган натижаларни жамланди ва OriginPro 6.1 (OriginLab Corporation; США) компьютер дастури ёрдамида қайта ишланди. Бунда қисқариш жавобларининг амплитудасини максимал жавобга нисбатан фоизларда ифодаланди ва 4-6 та турли тажрибаларнинг ўртача қийматлари ҳисобланди ($n=4-6$). P<0,05 ва P<0,01 қийматлари статистик аҳамиятли фарқларни кўрсатади.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Тажрибаларда 15-ацетоксиазометин атизиннинг папилляр мусқулига таъсири икки томонлама характерга эга эканлиги аниқланди, 15-ацетоксиазометин атизин паст концентрацияларида (<8 мкМ) ва қўзғатишнинг паст частоталарида (0,1-1 Гц) папилляр мускул қисқариш кучини ошириши, юқори концентрация ва юқори қўзғатиш частоталарида аксинча, камайтириши аниқланди.

Папилляр мускул қиқариш фаолилигига 15-ацетоксиазометин атизин алкалоидининг 5 мкМ концентрациясини таъсирини кузатганимизда папилляр мускул қисқариш кучини назорат даражасидан $21,8 \pm 3,2\%$ га ошиши кузатилди (1-расмга қаранг). Юрек мускули қисқариш кучининг бундай ошиши ёки мусбат инотроп таъсири (МИТ) қатор катехоламинлар (адреналин, норадреналин) таъсири учун хос бўлиб, у кардиомиоцитларда [Ca²⁺]_i нинг ошиши билан боғлиқ. Катехоламинларнинг бундай таъсири β-адренорецепторларнинг стимуляцияси туфайли таъминланиб, улар аденилатциклазани фаоллаштиради ва цАМФ фаоллашишини кучайтирган холда Ca²⁺ ионларининг сафарбар этилишига ва [Ca²⁺]_i нинг ошишига замин яратади ва бунинг натижасида юрак мускули қисқаришларининг кучайиши рўй беради [4]. Бу маълумотлар худди шунга ўхшаш механизм 15-ацетоксиазометин атизин алкалоидининг МИТ асосида ётиши мумкин деб таҳмин қилишга асос бўлади.

Тажрибаларимизда алкалоиднинг МИТ β-адренорецепторларнинг специфик блокатори бўлган пропраналол иштирокида ҳам сақланиб қолиши кузатилди, бу 15-ацетоксиазометин атизин алкалоидининг МИТ β-адренорецепторлар ва аденилатциклаза тизимининг фаоллашувига боғлиқ эмаслигидан гувоҳлик беради. Шу билан бирга, 15-ацетоксиазометин

атизиннинг таъсири потенциалга боғлиқ Ca^{2+} -каналларининг блокатори – нифедипин иштирокида ўтказилган тажрибалармизда ҳам кузатилиб, бу унинг МИТ мазкур каналлар орқали Ca^{2+} ионларининг кириб келиши билан боғлиқ эмаслигидан далолат беради. Шу билан бирга, 15-ацетоксиазометин атизин алкалоидининг МИТ қўзғатишнинг паст частоталарида (0,1-1 Гц), юрак мускулининг қисқариши асосан саркоплазматик ретикулум (СР) дан ажралиб чиқувчи Ca^{2+} ионлари ҳисобига таъминланувчи шароитларда кузатилди [5] ва тахмин қилиш мумкинки, унинг амалга ошишида СР даражасидаги худди шунга ўхшаш механизм иштирок этади. Бу тахминни текшириб кўриш учун 15-ацетоксиазометин атизиннинг худди юқорида қўрсатилганидек, папилляр мускулнинг пост-рест потенциациясига таъсири ўрганилди ва у Ca^{2+} ионларини СР га йиғилиши ва ажралиб чиқиши жараёнларини акс эттиради. Бунда муҳитда 15-ацетоксиазометин атизин (5 мкМ) мавжуд шароитда В1 биринчи қисқаришнинг амплитудаси 30 сониялик тинчлик давридан кейин назоратдан $76,6 \pm 8,1\%$ га ошиши кузатилди (2-расм, А га қаранг). Шу билан бирга, мазкур шароитларда стационар қисқаришлар амплитудасининг бирмунча қўтарилиши ҳам кузатилиб, у В1 га нисбатан бироз пастроқ бўлиб, нисбий потенциация қийматини ($2,20 \pm 0,18$) (B1/B0) назорат даражасига нисбатан $1,89 \pm 0,10\%$ га сезилари даражада ошишидан далолат беради (2-расм, Б га қаранг). Потенциация нисбати қийматини ошиши Ca^{2+} ионларининг СР йиғилиш жараёнини қўрсатгичи бўлиб [6], 15-ацетоксиазометин атизин алкалоидининг потенцирловчи таъсири Ca^{2+} нинг СР да йиғилишининг ва қўшимча ошишининг кучайишига боғлиқ бўлиб, у папилляр мускул қисқаришининг кучайишини таъминлайди. Ўтказилган тажрибалармиздан кўриниб турибдики, СР да Ca^{2+} ионлари микдорининг регуляциясида $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -алмашинувчи тизим муҳим рол ўйнаб, улар кардиомиоцитларга Ca^{2+} ионлари кириб келишини таъминлайди ва уларнинг СР да йиғилишини кучайтириб, юрак мускулининг қисқарувчанлик фаоллигининг ошишига имкон беради [7].

Шунингдек, Ca^{2+} ионларининг кардиомиоцитлардан чиқиб кетишини таъминловчи $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -алмашинувчи тизимнинг асосий функциясидан ташқари, ҳар бир қисқариш актидан кейин харакат потенциали платосининг тушиб кетиш вақтида уларнинг кириб келишида ҳам иштрок этади. Бундан ташқари юрак гликозидлари келтириб чиқарадиган мусбат инотроп таъсир ҳам $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -алмашинувчи тизим орқали кириб келадиган Ca^{2+} ионлари орқали таъминланади ва бунинг натижасида кардиомиоцитларда Na^+ ионларининг ҳужайра ичи даражаси пасаяди [8]. Бу маълумотларни $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -алмашинквчи тизимга 15-ацетоксиазометин атизиннинг потенцирловчи таъсирини таъмилашдаги эҳтимолий ролини ҳисобга олган ҳолда унинг специфик блокатори – КВ-R7943 иштирокида унинг таъсир эфектлари ўрганилди. Бунда КВ-R7943 нинг максимал таъсир концентрацияси иштирокида (30 мкМ), $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -алмашинувчи

тизим тўлиқ блоклаб қўйилган шароитда мухитга 5 мкМ 15-ацетоксиазометин атизиннинг киритилиши алкалоиднинг потенцирловчи таъсирининг ривожланишига олиб келмади (3-расм, А га қаранг). Шу билан бирга мазкур тажрибаларда аниқланилдики, КВ-R7943нинг паст концентрацияларида $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ - алмашинувчи тизимнинг функцияси қисман сақланиб қолганда 15-ацетоксиазометин атизин потенцирловчи таъсири келтириб чиқаради (3-расм, Б га қаранг).


Шундай қилиб, олинган тажриба натижалари шундан гувоҳлик берадики, 15-ацетоксиазометин атизин потенцирловчи таъсирини амалга оширишда, $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ -алмашинувчи тизим томонидан етказиб берилувчи Ca^{2+} ионлари иштирок этиб, улар кейинчалик СР кириб, папилляр мускул қисқаришининг кучайишига замин яратади.

Ушбу ўтказилган тажрибалар асосида олинга маълумотлар юрак қон-томир тизими касалликларини олидини олиш ва даволашда самарали таъсирга эга бўлган дори воситаларини яратишда фундаментал асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.


Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Джахангиров Ф.Н., Султанходжаев М.Н., Ташходжаев Б., Салимов Б.Т. Дитерпеноидные алкалоиды как новый класс антиаритмических средств. Взаимосвязь структура-активность // Химия природн. соедин. – 1997. – №2. – С. 254.
2. Zaynabiddinov A.E., Salimov B.T., Usmanov P.B. 15-atsetoksiyazometin atizin o'simlik alkaloidining kalamush yuragi papillyar muskuli qisqarish faolligiga musbat inotrop ta'siri // O'zbekiston biologiya jurnali – Toshkent, 2015 y. - №2. – 10-13 b. (03.00.00, №5)
3. М.Ш. Қодирова, Ф.М. Турсунходжаева, Б.Т. Салимов, Ф.Н. Джахангиров, Ж. Режепов. Атизин ва гетизин қатори алкалоидларининг антиаритмик таъсири ва кимёвий тузилиш – фаоллик муносабатлари // Farmatsevtika jurnali. 2010 - йил 4-сон 72-75 бет.
4. Bers D.M. Calcium fluxes involved in control of cardiac myocyte contraction // Circ. Res. – 2000. – Vol. 87. – P. 275-281.
5. Maier L.S., Pieske B., Allen D.G. Influence of stimulation frequency on $[\text{Na}^+]$ _i and contractile function in Lungendorff-perfused rat heart // Am. J. Physiol. – 1997. – V. 273. – P. H1246-H1254.
6. Maier L.S., Bers D.M., Pieske B. Differences in Ca^{2+} -handling and sarcoplasmic reticulum Ca^{2+} -content in isolated rat and rabbit myocardium // J. Mol. Cell. Cardiol. – 2000. – V. 32. – P. 2249-258.

7. Bers D.M., Christensen, D.M. Functional interconversion of rest decay and ryanodine effects in rabbit and rat ventricle depends on $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ exchange // J. Mol. Cell. Cardiol. – 1990. – V. 22. – P. 715-723.
8. Nesher M., Shpolansky U., Viola N., M. Dvela, N. Buzaglo, H. Cohen Ben-Ami, H. Rosen, and D. Lichtstein. Ouabain attenuates cardiotoxicity induced by other cardiac steroids // J. Pharmacol. – 2010. – V. 160. – P. 346-354.




1-расм. 15-ацетоксиазометин атизин алкалоиди инотроп таъсирининг унинг концентрацияларига боғлиқлиги. А. 5 ва 30 мкМ 15-ацетоксиазометин атизин инотроп таъсирининг оригинал записи. Б. 15-ацетоксиазометин атизиннинг папилляр мускул қисқаришларига таъсирини унинг концентрациясига боғлиқлиги. Ордината ўқида - мускул қисқариш кучи, 100% деб қабул қилинган максимал нисбатан фойизда ифодаланган. Барча ҳолларда $P<0,05$, ($n=6$).



2-расм. 15-ацетоксиазометин атизин (5 мкМ) ни каламуш юраги папилляр мускулининг пост-рест потенциациясига таъсири. А. 15-ацетоксиазометин атизиннинг (5 мкМ) папилляр мускул пост-рест потенциациясига таъсирини тасвирловчи ёзув. Б. 15-ацетоксиазометин

атизиннинг потенциация нисбатига (B1/B0) таъсири. Ордината ўқида – B1/B0 нисбати. **Барча ҳолларда P<0,05, (n=5).**



З-расм. $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ - алмашинувчи тизимнинг специфик блокатори KB-R7943нинг 15-ацетоксиазометин атизин алкалоидининг потенцирловчи эффикига таъсири. 15-ацетоксиазометин атизиннинг 30 мкМ (А) ва 20,6 мкМ (Б) KB-R7943 иштироқида папилляр мускул қисқаришига таъсири. Ордината ўқида - мускул қисқариш кучи, 100% деб қабул қилинган максималга нисбатан фойизларда ифодаланган. Барча ҳолларда P<0,05, (n=6).

РЕЗЮМЕ

В статье исследовано влияние растительного алкалоида 15-ацетоксиазометин атизина на сократительную активность папиллярной мышцы крысы.

SUMMARY

The article analyzes the effects of plant alkaloid 15-acetoxyazomethine atisine on the contractile activity of the rat papillary muscle was studied.